Circumcision

Classical | Stapler | Laser | IPC

Urocentre offers the latest circumcision facilities under one roof. With over 10000+ successful circumcisions, our highly evolved care system makes your circumcision experience as pain free and smooth as it can be.

यूरोसेंटर एक ही छत के नीचे नवीनतम सरकमसिज़न सुविधाएँ प्रदान करता है। 10,000 **से ज़्यादा सफल सरकमसिज़न के तजुर्बे के साथ, हमारी अत्यधिक विकसित देखभाल प्रणाली आपके सर्जरी के अनुभव को यथासंभव दर्द-मुक्त और सहज बनाती है।**

urocentre.in/circumcision

+918383812737

Which Circumcision should you choose?
आपको कौन सा सरकमसिज़न चुनना चाहिए?

UROCENTRE

Complete
पूर्ण

- Classical
  क्लासिकल
- Stapler
  स्टेपलर
- Energy/Laser
  लेज़र

Whole Glans exposed
पूरा ग्लान्स खुला हुआ

Minimum chances of recurrence
पुनरावृत्ति की न्यूनतम संभावना

Higher changes of skin shortening
त्वचा के छोटे होने की अधिक संभावना

Reduction in sensitivity
संवेदनशीलता में कमी

Partial
पार्शियल

- Dorsal Slit
  डोर्सल स्लिट
- Preputioplasty
  परिपुशिओप्लास्टी
- IPC
  ऑय पी सी
  - Standard
    प्रतिमान
  - Energy/Laser
    लेज़र

Glans remains covered
ग्लान्स ढका रहता है

mild chances of recurrence
पुनरावृत्ति की हल्की संभावना

Exra skin is available
अतिरिक्त त्वचा उपलब्ध रहती है

Rare incidence of prolonged swelling
लंबे समय तक सूजन की दुर्लभ घटना


IPC


Dorsal Slit

Preputioplasty

Stapler / ZSR

What is Circumcision ? सरकमसिज़न क्या है?
Circumcision is a painless daycare procedure to remove the foreskin. It can be performed with Staplers, laser and conventional methods.
सरकमसिज़न एक दर्दरहित डेकेयर प्रक्रिया है जिसमें चमड़ी को हटाया जाता है। इसे स्टेपलर, लेज़र और पारंपरिक तरीकों से किया जा सकता है।

When is circumcision performed ?
सरकमसिज़न कब किया जाता है?
Circumcision is performed for:
Skin conditions or diseases not responding to medicines

- Tightness of foreskin causing pain on pulling back or during
- intimacy
- Recurrent infections
- Maintaining penile hygiene
- Religious concern

खतना निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है:

- त्वचा की ऐसी स्थितियाँ या रोग जो दवाओं से ठीक नहीं होते
- अंग चमड़ी में कसाव जिससे पीछे खींचने पर या अंतरंगता के दौरान दर्द होता है
- बार-बार होने वाले संक्रमण
- लिंग की स्वच्छता बनाए रखना
- धार्मिक चिंता

Complications after surgery सर्जरी के बाद जटिलताएँ

Common problems that may happen after circumcision | सरकमसिज़न के बाद होने वाली सामान्य समस्याएँ:

- Infection | संक्रमण
- Bleeding | रक्तस्राव

UROCENTRE

Uncommon problems that may happen in 1out of 100 patients|100 में से 1 मरीज़ में होने वाली असामान्य समस्याएँ:

- Swelling that lasts for 3 to 6 months |3 से 6 महीने तक रहने वाली सूजन
- Tears at the stitch line during intercourse | संभोग के दौरान टाँकों की लाइन में फटना
- Need to remove the stitches | टाँकों या स्टेपलर पिन को हटाने की आवश्यकता

Rare complications include | दुर्लभ जटिलताओं में शामिल हैं:
मीटल स्टेनोसिस, रोग की पुनरावृत्ति, अपर्याप्त निष्कासन, कॉर्डी, ग्रंथि संबंधी परिगलन, आसंजन, धँसा हुआ लिंग, समावेशी सिस्ट, सिवनी साइनस, लिंग का छोटा होना
Meatal Stenosis, Recurrence of disease, Inadequate Removal, Chordee, Glandular Necrosis, Adhesions, Buried Penis, Inclusion Cysts, Suture sinus, Shortening of Penis

Preparing for Circumcision | सरकमसिज़न की तैयारी

Circumcision is performed most commonly under local anesthesia. The advantages of this form of anesthesia is that you can eat or drink immidiately after the procedure. You can also come to the centre full stomach to get this procedure. खतना आमतौर पर स्थानीय एनेस्थीसिया के तहत किया जाता है। इस प्रकार के एनेस्थीसिया का लाभ यह है कि आप प्रक्रिया के तुरंत बाद खा-पी सकते हैं। आप इस प्रक्रिया के लिए पेट भरकर भी केंद्र में आ सकते हैं।
You need to dress in a loose lower or shorts to keep yourself comfortable once you are discharged. डिस्चार्ज होने के बाद खुद को आरामदायक बनाए रखने के लिए आपको ढीले लोअर या शॉर्ट्स पहनने होंगे।

Take a note of the following recommendations and requirements prior to your procedure | अपनी प्रक्रिया से पहले निम्नलिखित सुझावों और आवश्यकताओं पर ध्यान दें:

- Declare all medications and medical conditions to your doctor prior to the procedure.प्रक्रिया से पहले अपने डॉक्टर को सभी दवाओं और चिकित्सीय स्थितियों के बारे में बताएँ।
- Bring a near and dear with you for sign as a witness and help our staff to take care of you post surgery. गवाह के तौर पर हस्ताक्षर के लिए अपने साथ किसी प्रियजन को लाएँ और सर्जरी के बाद आपकी देखभाल करने में हमारे कर्मचारियों की मदद करें।
- Avoid driving back on your own as medications any cause some sedation. खुद गाड़ी चलाकर वापस आने से बचें क्योंकि दवाएँ बेहोशी का कारण बन सकती हैं।
- Make sure that you are not taking any blood thinners or anticoagulants prior to the procedure.सुनिश्चित करें कि आप प्रक्रिया से पहले कोई रक्त पतला करने वाली दवा या एंटीकोआगुलंट्स नहीं ले रहे हैं।
- Shave your pubic hair prior to the surgery and take the morning bath.सर्जरी से पहले अपने गुप्तांगों के बाल शेव कर लें और सुबह स्नान करें।
- Please declare if you have any allergies.कृपया बताएं कि क्या आपको कोई एलर्जी है।

Is the surgery covered under medical insurance ? क्या यह सर्जरी चिकित्सा बीमा के अंतर्गत आती है?

Circumcision performed for balanoposthitis or foreskin
infections is covered by medical insurance. Tight foreskin
since birth is not covered. बैलेनोपोस्टहाइटिस या चमड़ी के संक्रमण के लिए किया जाने वाला खतना चिकित्सा बीमा द्वारा कवर किया जाता है। जन्म से ही चमड़ी का कसाव कवर नहीं किया जाता है।

Can I undergo this surgery under full body anaesthesia ? क्या मैं यह सर्जरी एनेस्थीसिया देकर करवा सकता/सकती हूँ?

If you are scared of the surgical procedure then you may consider getting the surgery under anaesthesia. Prior investigations and clearence for extensive anaesthesia is necessary and will increase the cost of the surgery. गर आपको सर्जरी से डर लगता है, तो आप एनेस्थीसिया देकर सर्जरी करवाने पर विचार कर सकते/सकती हैं। व्यापक एनेस्थीसिया के लिए पूर्व जाँच और अनुमति आवश्यक है.

Can I resume work immediately after the operation ? क्या मैं ऑपरेशन के तुरंत बाद काम पर वापस आ सकता हूँ?

One can resume office immediately after the procedure but the chances of bleeding and discomfort may increase. प्रक्रिया के तुरंत बाद काम पर वापस आ सकते/सकती हैं, लेकिन रक्तस्राव और असुविधा की संभावना बढ़ सकती है।

Can the problem recur after this procedure ? क्या इस प्रक्रिया के बाद समस्या फिर से हो सकती है?

It is very rare that the problem recurs after standard circumcision however if you are suffering from any skin conditions or the disease is extensive then they may recur.सामान्य खतने के बाद समस्या का फिर से होना बहुत कम होता है, लेकिन अगर आपको कोई त्वचा संबंधी समस्या है या बीमारी व्यापक है, तो यह फिर से हो सकती है।

UROCENTRE

Recovery Timeline
रिकवरी टाइमलाइन

Admission / अस्पताल में भर्ती
Time required / आवश्यक समय: 10 मिनट

Anesthesia Cream / एनेस्थीसिया क्रीम
Time required / आवश्यक समय: 30-60 मिनट

Surgery / सर्जरी
Time required / आवश्यक समय: 10 मिनट

Recovery
Time required / आवश्यक समय: 1-2 hours

Discharge
Time required / आवश्यक समय: 10-15 mins

Dressing training on day 1/ पहले दिन ड्रेसिंग की ट्रेनिंग
Time required / आवश्यक समय: 10-15 mins

Light Work / हल्का काम
Allowed after 1 day / 1 दिन के बाद अनुमति

Bathing / नहाना
Allowed after 3 days / 3 दिन के बाद अनुमति

Dressing & Stitch Removal / पट्टी और टांके
Required for 2 weeks / 2 सप्ताह के लिए आवश्यक

Running, Bike Riding, Suture removal / दौड़ना, बाइक की सवारी, टांकें हटाना
Allowed after 2 weeks / 2 सप्ताह के बाद अनुमति

Heavy Exercise, Sexual Activity / भारी व्यायाम
Allowed after 6 weeks / 6 सप्ताह के बाद अनुमति

Final Cosmetic Healing / कॉस्मेटिक रिकवरी
after 3-6 months / 3-6 महीने के बाद

UROCENTRE

To book your procedure you can contact us at:

urocentreindia@gmail.com

Urocentre.in

+918383812737

Wishing you the best recovery.